

## اطلاعیه فنی شماره ۱ حفظ نباتات

به کشاورزان زعفران کار توصیه می گردد نکات زیر را جهت افزایش عملکرد زعفران رعایت فرمایند :

۱) از کاربرد علف کش تری بنورون متیل ( گرانستار) جهت کنترل علف های هرز در مزارع زعفران جدا خودداری گردد.

۲) در بهار در مرحله ۴-۲ برگ علف های هرز باریک برگ میتوان از علف کش هالوکسی فوپ آرمتیل (سوپرگالانت) بمیزان ۱ لیتر در هکتار بر روی علف های هرز باریک برگ سمپاشی نمود .

۳) در طول زمستان با تغذیه مناسب و آبیاری زعفران بصورت منظم انجام گردد بطوریکه در اواخر اردیبهشت ماه ارتفاع بوته ها و برگ های زعفران به ۳۵-۳۰ سانتی متر رسیده و دارای ذخیره مواد غذایی کافی جهت گلدهی سال بعد باشد .

۴) جهت ضد عفونی بنه های (بیاز) زعفران قبل از کاشت بمنظور کنترل قارچ های خاکزی و کنه های عامل ورود قارچ ها می توان بنه های زعفران را قبل از کاشت با فرو بردن در محلول زیر بمدت ۳۰-۲۰ دقیقه ضد عفونی نمود .

۵) جهت کنترل قارچ های خاکزی قارچ کش ایپرودیون + کاربندازیم (رورال) و یا قارچ کش تیوفانات متیل (توپسین) بمیزان ۳۰ گرم و جهت کنترل کنه ها ، کنه کش بروموپروپیلات (نئورون) و یا کنه کش فن پروکسی مایت (ارتوس) بمیزان ۳۰ گرم در ۱۰ لیتر آب .

مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی اصفهان